

# ANOMALIES DES TROMPES DE L'UTERUS

## ■ Salpingite

### SYMPTOMES ET LESIONS

- Forme aiguë :
  - Les cellules de l'épithélium desquament, la muqueuse contient des kystes contenant des polymorphes dans leur lumière.
  - La muqueuse est infiltrée par des neutrophiles, des lymphocytes et quelques macrophages.
  - La musculature est oedémateuse.
- Forme chronique :
  - La trompe est très dilatée avec une grande quantité d'exsudat dans sa lumière ou bien obstruée par du tissu de granulation.
  - La couche muqueuse est atrophiée, infiltrée de lymphocytes. Le tissu conjonctif est très abondant. L'épithélium devient un épithélium squameux stratifié. La musculature est hypertrophiée.
  - Bien souvent, cette forme s'accompagne d'une métrite chronique.

## ■ Hydrosalpinx

### ÉPIDEMIOLOGIE

#### *Etiologie :*

- Il peut s'agir d'une séquelle de salpingite, ou bien résulter de la pression exercée par un kyste ou encore être causé par une anomalie congénitale.

### SYMPTOMES ET LESIONS

- Il peut toucher une partie ou la totalité de la trompe.
- La paroi de la trompe est fine et transparente, la muqueuse est très atrophiée.

#### **Bibliographie :**

- 1- LONG S.E., Some pathological conditions of the reproductive tract of the ewe, *Vet. Rec.*, 1980, **106**, 175-177
- 2- SMITH K.C., PARKINSON T.J., LONG S.E., Abattoir survey of acquired reproductive abnormalities in ewes, *Vet. Rec.*, 1999, **144**, 491-496
- 3- SOKKAR S.M., KUBBA M.A., Pathological studies on the fallopian tubes of Ewes, *Zbl. Vet. Med. A*, 1980, **27**, 118-122