

# PATHOLOGIE VAGINALE

## *Hors prolapsus*

### ■ Pathologie congénitale

#### *~ Atrésie vaginale ~*

- Cette pathologie représente environ 40% des anomalies génitales dépistées chez les agnelles.

### ■ Pathologie acquise

#### EPIDEMIOLOGIE :

#### *~ Rupture vaginale ~*

- Hormis les traumatismes (bien souvent causés par l'homme et surtout les enfants), il existe des cas de rupture spontanée de la paroi vaginale.
- Cette maladie touche les femelles gestantes en ante partum, elle apparaît chez les pluripares dans la dernière semaine de gestation.
- Les torsions utérines, les prolapsus vaginaux fragilisent la paroi utérine.
- Le manque d'exercice et le surpoids sont des facteurs favorisants, de même les portées multiples.

#### *~ Fibrome vaginal ~*

- Il s'agit d'une tumeur vaginale dont le risque d'apparition augmente avec l'âge. La jeunesse du cheptel ovin et caprin ne permet pas d'observer de nombreux cas.

#### SYMPTOMES ET LESIONS

#### *~ Rupture vaginale ~*

- La déchirure se fait dans la partie dorsolatérale du vagin à proximité du col de l'utérus.
- Des organes abdominaux apparaissent à la vulve de la femelle, il peut s'agir des anses intestinales, l'utérus ou le caecum.
- Des douleurs abdominales intenses peuvent être les seuls symptômes.
- La déchirure peut entraîner une hémorragie interne.

#### *~ Fibrome vaginal ~*

- Cette tumeur chez les femelles gestantes peut aboutir à une dystocie par encombrement des voies génitales.

#### DIAGNOSTIC

#### *~ Rupture vaginale ~*

- La palpation vaginale permet l'identification de la maladie.

#### *~ Fibrome vaginal ~*

- Par palpation vaginale on peut repérer cette masse.
- Lorsqu'elle fait protrusion au travers des lèvres de la vulve, il faut la distinguer d'un prolapsus vaginal.

## CONDUITE A TENIR

### *~ Rupture vaginale ~*

- Une évaluation de l'état général de la mère aide au choix de la conduite à tenir.
- Lors d'intervention, un surjet simple permet de refermer le vagin. La césarienne est recommandée.

### *~ Fibrome vaginal ~*

- La césarienne est nécessaire lorsque cette masse gêne le part.

## PROPHYLAXIE

### *~ Rupture vaginale ~*

- L'exercice, une alimentation adaptée permettent de limiter le risque.

### *~ Fibrome vaginal ~*

- Garder un troupeau jeune permet de limiter l'impact de cette pathologie.

## **Bibliographie :**

- 1- ANDERSON, Vaginal rupture in ewes, *Vet. Rec.*, 1988, **122**, 543
- 2- CHAUDHRY N.I., Rupture of the vagina in a pregnant ewe, *Vet. Rec.*, 1979, **104**, 220
- 3- DENNIS S.M., Urogenital defects in sheep, *Vet. Rec.*, 1979, 13, 344-347
- 4- HANSEN A.T., PLANT J.W., Tearing of vaginal wall with intestinal prolapse in pregnant ewes, *Aust. Vet. J.*, 1980, **56**, 510-511
- 5- MOSDOL G., Spontaneous vaginal rupture in pregnant ewes, *Vet. Rec.*, 1999, **144**, 38-41
- 6- VERBERCKMOES S., DE BOSSCHERE H., VAN SOOM A., VERVAET R., DE KRUIF A., Intravaginal fibroma in a sheep, *Vet. Rec.*, 2003, **152**, 566-567