

STREPTOCOCCIE MAMMAIRE OVINE

Epidémiologie

ETIOLOGIE :

- o *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*
- o *Streptococcus parasanguinis*
- o *Streptococcus equi* subsp *zooepidemicus*, bactérie fréquemment retrouvée dans les voies respiratoires et le tractus génital des équidés.

INCIDENCE – PREVALENCE

- o Cas assez rares contrairement aux bovins.

Symptômes et lésions

- o *Streptococcus equi* subsp *zooepidemicus* provoque une modification du lait (il prend un aspect aqueux avec des flocculats de pus) avant une chute importante de la production jusqu'à l'agalactie. Cette mammite est parfois appelée « pseudoagalactie » du fait de sa ressemblance avec l'agalactie contagieuse à *Mycoplasma agalactiae*

Bibliographie:

- 1- LAS HERAS A., VELA A.I., FERNANDEZ E., LEGAZ E., DOMINGUEZ L., FERNANDEZ-GARAYZABAL J.F., Unusual Outbreak of Clinical Mastitis in Dairy Sheep Caused by *Streptococcus equi* subsp. *Zooepidemicus*, *J clinic microbio*, 2002, **40**, 1106-1108
- 2- QUINLIVAN T.D., Survey observations on ovine mastitis in New Zealand stud romney flocks 2. The Bacteriology of Ovine Mastitis, *N Z Vet J*, 1968, **16**, 153-160
- 3- MENZIES P.I., RAMANOON S.Z., Mastitis of sheep and goats, *Vet Clin North Am Food Anim Prac*, 2001, **17**, 333- 356