

MISE BAS

La mise bas s'annonce par des signes plus ou moins marqués. Parmi les moins informatifs (car ils arrivent à un moment différent selon la chienne), on note le changement de comportement, la construction d'un nid, le grattage du sol et la montée de lait qui peut être très précoce ou au contraire très tardive, en particulier chez les chiennes dont c'est la première portée. Les signes les plus fiables sont le relâchement des ligaments du bassin et de la vulve 48 heures avant la mise bas et la baisse de la température rectale (98% des chiennes ont une température qui chute de 1° dans les 24 à 48 heures précédant la mise bas).

La mise bas commence par une phase préparatoire d'une durée de 6 à 12 heures qui correspond au début des contractions utérines et à l'ouverture du col de l'utérus. Ensuite, la mise bas proprement dite, correspondant à l'expulsion d'un chiot suivi de son placenta, dure 4 à 8 heures en moyenne. Le chiot sort la tête et les pattes avant en premier dans 60% des cas et donc les pattes arrière en premier dans 40% des cas.

Conduite à tenir pendant la mise bas

- Surveiller discrètement la chienne et savoir attendre : le tableau ci-dessous (d'après Alain Fontbonne) présente les durées habituelles des étapes principales de la mise bas et les durées au-delà desquelles il faut consulter son vétérinaire.

stade	durée normale	s'inquiéter
début du travail	moins de 24 heures après la chute de température	pas de travail 48 heures après la chute de température
temps d'expulsion d'un chiot engagé	20 à 30 minutes	plus d'une heure
temps entre deux chiots	20 à 30 minutes	plus de 2 heures
poussées improductives		plus de 30 à 60 minutes
expulsion du placenta	5 à 15 minutes après le chiot	plus de 30 minutes après le chiot
durée totale après le début du travail	4 à 8 heures, jusqu'à 24 heures pour les grosses portées et/ou les chiennes PRIMIPARES	

- Pour chaque chiot, le dégager de ses enveloppes fœtales si la mère ne le fait pas, le moucher à l'aide d'un mouche-bébé, couper son cordon ombilical, y nouer un fil de coton puis le désinfecter. Enfin, frictionner le chiot et le peser.
- Vérifier que tous les chiots prennent un premier repas, au plus tard dans les 6 heures après leur naissance.
- Surveiller la température de la pièce où se trouvent les chiots, la 1^{ère} semaine elle doit être à 30°, les 3 semaines suivantes à 27° idéalement.
- Apporter à la mère un aliment pour chiots de bonne qualité, distribué à volonté. Si la chienne maigrit trop, il faut biberonner les chiots ou les sevrer précocement si leur âge le permet.