

PYOMETRE

Le pyomètre est une inflammation de l'utérus associée à une prolifération bactérienne et à une accumulation de pus en grande quantité dans l'utérus.

On distingue deux types de pyomètres :

- Le pyomètre à col ouvert (65% des cas) : le col de l'utérus est ouvert et il laisse s'écouler le pus qui est souvent de couleur foncée.
- Le pyomètre à col fermé (35% des cas) : le col de l'utérus, fermé, retient le pus qui s'accumule dans l'utérus. Aucun écoulement à la vulve n'est donc visible.

Dans les deux types de pyomètres, les symptômes généraux sont tardifs (ils apparaissent quelques jours à quelques semaines après le début de l'accumulation de pus) mais évocateurs : abattement, hyperthermie importante, anorexie, augmentation de la prise de boisson, vomissements, douleur abdominale...

Le pyomètre apparaît toujours dans les deux mois qui suivent la fin des chaleurs.

Le pyomètre est rencontré principalement chez les chiennes âgées (**âge moyen 8 ans**) ou chez des chiennes ayant subi des traitements hormonaux (avortements, prévention ou suppression des chaleurs) ou présentant une anomalie congénitale de l'appareil génital. Le fait que la chienne ait eu une ou plusieurs portées antérieurement ou non n'a pas d'influence sur le risque de pyomètre.

Le diagnostic est souvent établi à partir de l'examen clinique de la chienne. Cependant, il est parfois nécessaire de confirmer ce diagnostic par un examen d'imagerie médicale, surtout si le col utérin est fermé. L'examen de choix est l'échographie abdominale ou à défaut, un cliché radiographique qui permet dans certains cas de visualiser l'utérus dilaté.

Le traitement du pyomètre, chirurgical ou médical, dépend de l'état général de la chienne et du désir ou non de la faire reproduire par la suite. Il faut cependant retenir que **le pronostic sera d'autant meilleur que le traitement interviendra précocement.**

L'**ovariohystérectomie** reste le traitement de choix. Plus l'opération est réalisée rapidement après le début des symptômes et plus le risque anesthésique sera faible. Si la chienne est très abattue, des examens sanguins et une réanimation médicale avant l'opération peuvent être nécessaires. Une telle intervention stérilise la chienne qui ne pourra ensuite plus reproduire.

Les molécules utilisées lors du **traitement médical** agissent en provoquant l'ouverture du col utérin et en stimulant les contractions de l'utérus afin de faciliter sa vidange. Associées à des antibiotiques, elles donnent de bons résultats sur les pyomètres à col ouvert. En revanche, en cas de pyomètre à col fermé, elles ne sont efficaces que si le col s'ouvre dans les trois jours qui suivent le début du traitement.

Le traitement médical dure 14 jours au minimum mais rarement plus de 28 jours. La chienne devra être amenée chez le vétérinaire tous les jours les 8 premiers jours puis toutes les semaines jusqu'à guérison.

Il est conseillé de mettre la chienne à la reproduction ou d'effectuer un contrôle aux chaleurs suivant la guérison car le risque de **récidive est de 20 à 25%**.